



NOTRE SOLUTION

GEL INSECTICIDE ANTI-BLATTES

- ✓ Action rapide et longue durée
- ✓ Élimine blattes et cafards à tous les stades
- ✓ Effet domino : élimine la colonie



OÙ DÉPOSER LES GOUTTES DE GEL ?

Déposer des gouttes équivalentes à une lentille, espacées de 20 à 30 cm.



GOUTTE DE GEL
(équivalente à une lentille)




ESPACEMENT
20 à 30 cm


Sous les
charnières
de porte




Dans les rainures,
fentes et fissures




Derrière le
réfrigérateur




Autour des meubles
de cuisine, entre le
mur et les meubles



Derrière le
lave-vaisselle



Derrière la
machine à laver



MODE D'EMPLOI - POSE DE GOUTTES

- Déposer des gouttes de gel (équivalent à une lentille) espacées de 20 à 30 cm aux endroits ciblés indiqués.
- Appliquer uniquement dans les zones humides, chaudes et sombres privilégiées par les blattes.
- Éviter le nettoyage immédiat des zones traitées.
- Laisser les blattes consommer le gel et le diffuser à la colonie.
- Renouveler les gouttes une fois par mois jusqu'à disparition complète de l'activité.

CAS D'INFESTATION IMPORTANTE AJOUTER DES PIÈGES DE MONITORING



- Permet de suivre l'activité des blattes et d'identifier les zones les plus fréquentées.
- Aide à évaluer l'efficacité du traitement et à ajuster les applications.
- Placer les pièges le long des murs, dans les angles, sous les appareils et dans les endroits sombres.

VÉRIFIER LES PIÈGES CHAQUE SEMAINE
ET NOTER LES OBSERVATIONS.

CONSIGNES D'UTILISATION



NE PAS PULVÉRISER
D'INSECTICIDE
À PROXIMITÉ DU GEL



NE PAS ESSUYER
LES GOUTTES
DE GEL



TENIR HORS DE PORTÉE
DES ENFANTS ET DES
ANIMAUX DOMESTIQUES



UTILISER UNIQUEMENT
LA QUANTITÉ
RECOMMANDÉE

FRÉQUENCE DES TRAITEMENTS



1. CONTRÔLE VISUEL RÉGULIER
Inspecter les zones traitées
et vérifier la présence d'activité
(excréments, mues, insectes vivants).



2. RENOUELER LES GOUTTES
Renouveler les gouttes
consommées ou desséchées
afin de maintenir l'attractivité
du gel.



3. TRAITEMENT RECOMMANDÉ
**TRAITEMENT 1 FOIS
PAR MOIS**
jusqu'à disparition complète
de l'activité.



4. MAINTENIR LE MONITORING
Conserver les pièges de monitoring
quelques semaines après les
dernières observations pour
prévenir toute réinfestation.



PRIVILÉGIER TOUJOURS LES ZONES HUMIDES, CHAUDES ET SOMBRES.
CIBLER LES RAINURES, FENTES ET FISSURES.



Les blattes se cachent le jour et sortent
la nuit pour chercher nourriture et eau.



EXPERTISE
PROFESSIONNELLE



PRODUITS
HAUTE PERFORMANCE



EFFICACITÉ
PROUVÉE



SÉCURITÉ
D'UTILISATION

